

AVULSÃO E REIMPLANTE IMEDIATO EM PROTOCOLO NÃO CONVENCIONAL: RELATO DE CASO

DUTRA, Josieli Rettmann.¹
SOUZA, Cleide Alves de.²
LAGARES, Nubia Araújo.³
ROCHA, Rochelle Jamile Neres.⁴
TORTATO, Patricia Mendonça Tassara.⁵

RESUMO

O traumatismo dento-alveolar tem se tornado frequente, tendo como maior consequência à avulsão dentária que é a completa remoção do dente do alvéolo, causando danos à estruturas de suporte e a estruturas pulpar, sendo os incisivos centrais os dentes mais envolvidos. Os elementos avulsionados devem ser reimplantados imediatamente após o trauma em condições adequadas aumentando as chances de sucesso, e evitando o impacto psicológico decorrente da perda imediata do elemento dental, sendo o reimplante a conduta mais conservadora. O trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de avulsão e reimplante dental onde foi realizado o reimplante imediato porém em condições inadequadas. Analisar a evolução resultante da conduta inadequada do paciente no momento do trauma, identificar as alterações do elemento dental reimplantado e tecidos adjacentes após traumatismo, Descrever o protocolo clínico e terapêutico que devem ser realizados em casos de reimplante dental de acordo com a literatura. No dia 04 de outubro de 2014, o paciente R. S. A. 20 anos, apresentou-se na clínica da Facimed relatando que sofreu trauma e que o procedimento de reimplante foi realizado imediatamente relatando que limpou o dente na camisa e reposicionou no alvéolo de forma inadequada decorrente da contaminação do elemento dental, foi realizada a contenção que foi removida após 14 dias, através do exame clínico e radiográfico, e teste de sensibilidade não foi possível detectar nenhuma alteração periapical. O paciente foi acompanhado através de exames clínicos e radiográficos periódicos, a realização do tratamento endodôntico foi iniciada com medicação intracanal de hidróxido de cálcio sendo mantida por um período de 3 meses com troca de medicação a cada 30 dias e posteriormente a obturação, O elemento dental se encontra em função permitindo uma adequada reabilitação funcional, preservando a estética e as trocas de medicação intracanal foi essencial para o sucesso do tratamento, Atualmente nota-se regressão da lesão periapical, ausência de mobilidade e radiograficamente a estabilização da reabsorção radicular.

Palavra chave: Avulsão dentária. Reimplante. Evolução.

¹Graduando em Odontologia pela FACIMED. E-mail: josielly-rettmann@hotmail.com

²Graduando em Odontologia pela FACIMED. E-mail: edy.souza@hotmail.com

³Graduando em Odontologia pela FACIMED. E-mail: nubia_lagares@hotmail.com

⁴Graduando em Odontologia pela FACIMED. E-mail: rochellejamil@gmail.com

⁵Cirurgiã Dentista, Especialista e Docente da graduação em Odontologia da faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal- FACIMED, E-mail: ptassara@hotmail.com