

USO CONTÍNUO DO OMEPRAZOL POR PACIENTES DE UMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CACOAL-RO E SEUS EFEITOS COLATERAIS.

HACK,Leandro .1

SCOPEL,Klismann Korte.2

GUTIERRES, Helen Mitissi Nascimento .3

RESUMO

O omeprazol é um medicamento utilizado para neutralizar a secreção ácida, reduzindo-a (antagonistas H₂ e inibidores da bomba de prótons), e protegendo a mucosa, normalmente utilizado em casos de esofagite, gastrite, acidez estomacal, úlcera duodenal, úlcera do estômago. A pesquisa teve como principal objetivo identificar a existência de efeitos colaterais e as patologias prevalentes nos pacientes que fazem uso contínuo do medicamento Omeprazol em uma Farmácia comercial no centro da cidade de Cacoal/RO. O presente trabalho apresentará uma pesquisa de forma quantitativa transversal em forma de questionário após a aceitação do termo de livre e esclarecido, no período do início de agosto até final de setembro de 2015, os pacientes preencheram os critérios de inclusão sendo eles: maior de 18 anos de idade, ambos os sexos e que fazem o uso do omeprazol sem associação por mais de 4 semanas. Foram avaliados 52 pacientes, no ato da compra do Omeprazol receberam o questionário que visava identificar: sexo, idade, grau de escolaridade, local de moradia, se fazem o uso contínuo do omeprazol, qual a patologia, efeitos colaterais, dose/tempo do uso do medicamento. Os principais efeitos colaterais obtidos na pesquisa foram: Náuseas, boca seca, fraqueza, cólicas abdominais, obstipação, cefaléia, anemia por falta de vitamina b12, osteoporose e até demência. De acordo com a pesquisa, 51,92% dos pacientes são do sexo Feminino e 48,08% são do sexo masculino, dessa amostra pesquisada 65,38% fazem o uso do omeprazol através de receituário médico e 34,62% fazem a automedicação, observou-se que 53,84% dos pacientes que participaram da pesquisa apresentaram um ou mais dos sintomas mencionados anteriormente, sendo eles: náusea 34,61%, cólica abdominal 13,46%, boca seca 11,53%, obstipação 5,76%, tonturas 5,76%, cefaléia 1,92%. Os resultados apontam uma alta taxa do uso indiscriminado de Omeprazol e automedicação com 34,62% dos pacientes afirmando utilizar o mesmo por conta própria, dessa forma o profissional Farmacêutico, no uso de suas atribuições, deve orientar o paciente junto ao uso do medicamento mediante receita médica, visando, com isso, reduzir o uso abusivo e a automedicação.

Palavras- chave: Omeprazol. Efeitos Colaterais. Uso Contínuo.

1

¹ Bacharelado em Farmácia, Farmácia Generalista, leandrohack2011@hotmail.com

² Bacharelado em Farmácia, Farmácia Generalista, kiima@hotmail.com

³ Esp.Farmacologia,Farmácia Generalista, helemfarmaciabioquimica@hotmail.com