

## SIMPATRIA ENTRE *Saguinus weddelli* E *Mico rondoni* NA FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, RO

SILVA-DIOGO, Odair<sup>1</sup>  
COSTA, Thatiane Martins<sup>2</sup>  
GUSMÃO, Almério Câmara<sup>3</sup>

### Resumo

Os primatas neotropicais (Primates, platyrrhini) são animais arborícolas, de habito social, importantes prestadores de serviços ecológicos como polinizadores e dispersores de sementes, atuando na manutenção de florestas nativas e na reconstituição da vegetação em áreas degradadas. O objetivo do estudo foi registrar a ocorrência de associação simpátrica entre *Saguinus weddelli* e *Mico rondoni*, na floresta nacional do Jamari, Estado de Rondônia. A floresta nacional do Jamari é uma reserva federal, com 225.799 há que abrange os municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Candeias do Jamari, RO. Com bioma predominante amazônico, seu objetivo principal é o uso múltiplo sustentável de seus recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de floresta nativa. Para obtenção dos dados utilizou-se método de transecção linear em trilhas, durante aula de campo nos dias 21 e 22 de maio de 2016. Durante caminhada nas trilhas foi registrada a ocorrência de associação simpátrica entre *S. weddelli* e *M. rondoni*. na ocasião pode ser observada formação de bando misto, com cinco indivíduos da espécie *S. weddelli*, sendo dois adultos, dois filhotes e um juvenil, e quatro indivíduos da espécie *M. rondoni*, sendo três adultos e um filhote. Durante acompanhamento do bando misto os indivíduos de *M. rondoni* demonstraram ser mais arredios, realizando fissão-fusão e utilizando os estratos mais altos da floresta. Enquanto que os indivíduos de *S. weddelli* demonstram ser curiosos o que permitiu maior aproximação, utilizando o estrato médio e baixo da floresta. Durante coleta de dados foi observado *M. rondoni* alimentando de seiva. Alguns estudos registraram ocorrência de simpátria entre *S. weddelli* e *M. rondoni* no estado de Rondônia, entretanto, são poucos estes registros e em sua maioria são registros pontuais. Portanto registrar e analisar associação simpátrica entre Callitriquíneos é de suma importância para entender as diversas relações ecológicas e estratégias de forrageamento destes primatas.

**Palavras-chave:** Simpátria. *Saguinus weddelli*. *Mico rondoni*

---

<sup>1</sup>Acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED & Grupo de Trabalho e Conservação do Gavião Real no Estado de Rondônia odair\_diogo@hotmail.com

<sup>2</sup>Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED & Grupo de Trabalho e Conservação do Gavião Real no Estado de Rondônia

<sup>3</sup>Grupo de Trabalho e Conservação do Gavião Real no Estado de Rondônia & Laboratório de Mastozoologia da Universidade do Mato Grosso - UNEMAT