

AMILOIDOSE CUTÂNEA PRIMÁRIA LOCALIZADA: LÍQUEN AMILOIDE

AMOROSO, Sara de Lima Oliveira¹
COLOMBO, Lana Caroline²
QUERINO, Yarima da Róss³
CONTO, Mônica Alexandra de⁴
MARQUES, Sandra Maíra Veloso Carrijo⁵

RESUMO

O líquen amiloide ou líquen amiloidótico (LA) é a forma mais comum de amiloidose cutânea primária localizada (PLCA), e caracteriza-se por pápulas hemisféricas, isoladas ou tipicamente dispostas em “rosário”. A localização é mais frequente em pernas, mas pode acometer também extremidades superiores e tronco. Acredita-se que seja mais prevalente no sexo masculino e na faixa etária entre 50 e 60 anos. Múltiplos fatores estão envolvidos na patogênese da doença como: atrito, predisposição genética, e até mesmo vírus Epstein-Barr. O objetivo do trabalho foi relatar um caso de líquen amiloidótico de evolução crônica e sem tratamento prévio. Trata-se de informações obtidas por meio de prontuário, anamnese e revisão de literatura. Paciente do gênero feminino, casada, 53 anos, melanodérmica, procedente de Cacoal (RO), foi assistida em unidade básica de saúde do interior de RO, em setembro de 2017, com queixa de lesões pruriginosas em ambas pernas há 20 anos. Negou dor, sangramento, descamação, drenagem de secreção, sinais flogísticos e uso de medicamentos. Ao exame dermatológico: placas papulosas, hipercrômicas, ceratóticas, com 5mm de diâmetro, principalmente nas faces anterior e laterais de membros; presença de xerose cutânea e crostas secundária a escoriação. Foi realizado biópsia incisional por punch em dois locais do MMII esquerdo e enviado para realização de anatomopatológico, onde se espera, de acordo com a apresentação clínica, detectar depósito de substância amiloide na derme papilar, além de acantose e hiperqueratose. Após confirmado o diagnóstico, o tratamento será feito com infiltrações intralesionais de corticoide e uso anti-histaminicos orais a fim de interromper o ciclo prurido-coçadura-prurido geralmente presente. Em suma, pelo fato do líquen amiloide constituir uma queixa de grande desconforto, principalmente pelo prurido, o médico deve estar atento para este diagnóstico.

Palavras-chave: Líquen amiloide. Amiloidose cutânea. Ceratose.

¹ Acadêmica Graduanda em Medicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. saradeloa@gmail.com

² Acadêmica Graduanda em Medicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. laanacolombo@hotmail.com

³ Acadêmica Graduanda em Medicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. yara.ross@yahoo.com.br

⁴ Acadêmica Graduanda em Medicina pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. mony.alexandra@hotmail.com

⁵ Orientadora. Médica Dermatologista. Docente da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal – FACIMED, 2017. smaira.marques@gmail.com