

AVALIAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

SANTOS, Nataly Suelen Fabri dos¹

OLIVEIRA, Daniela Nóia de²

RONDOW, Melquisedeck Von³

LELIS, Flavia Silva⁴

SILVA, Harrison Carlos da⁵

RESUMO

Acidente vascular encefálico (AVE) é uma lesão neurológica aguda de origem vascular e com rápida evolução dos sinais clínicos. Cerca de 90% dos sobreviventes desenvolvem alguma deficiência, sendo uma das principais causas de sequelas neurológicas no adulto. Objetivo foi verificar o nível funcional predominante nos indivíduos com sequelas de AVE e em quais atividades apresentaram maior comprometimento funcional. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 06 pacientes com diagnóstico médico de AVE, de ambos os sexos e com idade média de 67,2 anos, atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da FACIMED, no período de outubro a novembro de 2012. Critérios de inclusão paciente com diagnóstico de AVE com idade superior a cinquenta anos e de exclusão pacientes que não se comunicam verbalmente, não responderam todo o questionário e idade inferior a cinquenta anos. Projeto (870-12). O Índice de Barthel foi utilizado com a finalidade de avaliar a funcionalidade dos pacientes. A análise dos dados foi realizada de forma simples descritiva através do programa Microsoft Office Excel 2007. Neste estudo pôde-se observar que houve predomínio de pacientes do sexo masculino. Todos apresentaram AVE do tipo isquêmico e comprometimento no hemisfério esquerdo. 83% dos indivíduos apresentaram dependência moderada e 17% apresentaram dependência severa para realizar suas atividades diárias. Os domínios banho, vestuário e higiene pessoal foram às atividades que apresentaram o maior índice de dependência. O presente estudo demonstrou que a maioria dos participantes desta pesquisa apresentou dependência moderada na realização de suas atividades diárias e que os domínios banho, vestuário e higiene pessoal foram às atividades que apresentaram os maiores índices de dependência, demonstrando que as sequelas causadas pelo AVE interferiram de forma expressiva no nível de independência funcional, tornando-os dependentes para realização das suas atividades de vida diárias (AVDs).

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Avaliação em Saúde.

¹ Graduanda do curso Bacharelado em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. <na_suelen@hotmail.com>

² Graduada do curso Bacharelado em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. <daninoia@hotmail.com>

³ Docente com graduação em Fisioterapia pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. Especialista em Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal. <melkvrw@gmail.com >

⁴ Docente Co-Orientadora com Graduação em Fisioterapia pela Universidade de Cuiabá, Brasil (2005). <flavia.facimed@hotmail.com>

⁵ Docente Orientador com Mestrado Profissional em Terapia Intensiva pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, Brasil (2013) Professor no curso de medicina e fisioterapia da Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, Brasil. <harrison.facimed@hotmail.com>